ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

19. Rapport

Des observations de monsr Miraud Dr en medecine
et Chirurgien en chef de l'hotel dieu a angers.

IV 1420

Le Cahier d'observations envoyé à l'académie par monsr Miraud en contient trois, La premiere sur une tumeur squirreuse de la glande lacrimale guérie par extirpation de cette tumeur et par celle du globe de l'oeil dont les membranes avoient été viciées par la pression qu'elles avoient soufferte; monsr Antaford en a fait un rapport particulier; les deux autres sur un anevrisme au bras guéri par une methode attribuée à monsr Hunter, et sur une tumeur de la nature des ganglions, située au Coude et extirpée avec succès.

Mr Miraud intitule son observation de l'anevrisme Cure d'un anevrisme vrai de l'artère brachiale. Cette tumeur étoit cependant survenue à la suite d'un coup de bayonnette qui avoit traversé obliquement la partie moyenne et antérieure du bras. Le 15 7bre 1787 elle étoit parvenue au volume d'une pomme de rambour, six mois et demi et plus après

ARC 40 n° 17

l'accident qui l'avoit donné lieu. M. Girard fit au bras une incision
de deux pouces et demi de longueur, en commençant un demi pouce au
dessus de la tumeur, et en montant vers le creux de l'aisselle. il mit
l'artère brachiale à découvert et fit deux ligatures à deux lignes de
distance l'une de l'autre. Le 5e jour l'appareil étoit assés humecté
pour qu'on ait pu le changer. Le 6e les deux ligatures se détachèrent
et on vit tomber la portion du tube artériel comprise dans leur intervalle.
en huit jours, la tumeur diminua d'un sixième et perdit ses battemens.
La plaie s'étoit [illegible] dès le lendemain de l'opération. Le bras a
conservé sa chaleur et sa sensibilité. une compression modérée a réduit
la tumeur au point qu'elle n'excède pas de huit lignes le niveau du bras.
sa longueur est de deux pouces. sa largeur d'un pouce et demi. elle présente
au toucher une tumeur applatie, ovalaire, dure, mobile et insensible qui
ne gêne pas les mouvemens ~~du bras~~. Ce fait est véritablement intéressant
en ce qu'il donne le résultat d'une opération insolite et qu'on a peu
d'occasion de pratiquer.

Celui qui a pour objet l'extirpation d'une tumeur de la nature des -
ganglions ne l'est pas moins. La tumeur dont il s'agit située au dessus du
coude étoit survenue à la suite d'un coup reçu en cette partie sept ans avant.
Les élancemens douloureux qu'elle occasionnoit déterminerent à l'emporter. elle
se trouva située dans l'épaisseur même du nerf cubital et de nature squirreuse
entre-mêlée de concrétions dures et lymphatiques. la section du nerf cubital
dont il a fallu emporter la partie qui formoit la tumeur, n'a eu aucune
suite fâcheuse, et la guérison en a été opérée en trois semaines.

L'académie peut employer utilement ces faits lorsqu'elle traitera de sujets -
analogues. En l'académie Royale de Chirurgie ce 22 juillet 1790

Sabatier